

Université des Antilles et de la Guyane
FACULTÉ DES SCIENCES EXACTES ET NATURELLES
Département Scientifique Interfacultaire (Campus de Schoelcher, Martinique)
DEUG MIAS 1^E ANNÉE * MATHÉMATIQUES 1 * ANNÉE 2004-2005

Travaux Dirigés * Série 1

N.B. : Les exercices dont les numéros sont suivis d'une * sont **non** prioritaires.

Exercice 1. On suppose que $|x - 1| \leq 2$ et que $-5 \leq y \leq -4$.
Encadrer les quantités suivantes :

$$1) \ x + y \quad 2) \ x - y \quad 3) \ xy \quad 4) \ \frac{x}{y} \quad 5) \ |x| - |y|.$$

Exercice 2. Démontrer la proposition suivante :

« Si un ensemble A inclus dans $\mathbb{R}$ possède un plus grand (respectivement plus petit) élément, celui-ci est unique. »

Exercice 3. Pour chacun des sous ensemble suivants de $\mathbb{R}$, dire s'il y a un plus grand élément, un plus petit élément, une borne inférieure, une borne supérieure :

$$1) \ \mathbb{N}, \quad 2) \ [0, 1[, \quad 3) \ \left\{1 + \frac{1}{n}; \ n \in \mathbb{N}^*\right\}.$$

Exercice 4.* Montrer que l'ensemble A défini comme suit est minoré et non majoré :

$$A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in \mathbb{R}^* : x = \frac{a^2 + 1}{a^2}\right\}$$

Exercice 5.* Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$. On note

$$A + B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists (a, b) \in A \times B ; x = a + b\} ; \quad -A = \{x \in \mathbb{R} \mid -x \in A\}$$

(a) On suppose que A est majorée ; montrer que $-A$ admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$, et que

$$\inf(-A) = -\sup A$$

(b) On suppose que A et B sont majorées ; montrer que $A + B$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$, et que

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

Exercice 6. 1) Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer les implications suivantes :

$$\begin{aligned} a) \quad & (\forall \epsilon > 0, \ 0 \leq x \leq \epsilon) \implies x = 0 ; \\ b) \quad & (\forall n \in \mathbb{N}^*, \ 0 \leq x \leq \frac{1}{n}) \implies x = 0 . \end{aligned}$$

2) Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$. Montrer les implications suivantes :

$$\begin{aligned} c) \quad & (\forall \epsilon > 0, \quad 0 \leq |x - y| \leq \epsilon) \implies x = y ; \\ d) \quad & (\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq |x - y| \leq \frac{1}{n}) \implies x = y . \end{aligned}$$

Exercice 7.* Déterminer les bornes inférieures et supérieures, lorsqu'elles existent, des ensembles :

$$(a) \quad E = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{n} ; n \in \mathbb{N}^* \right\} \quad (b) \quad E = \left\{ \frac{1 + (-1)^n}{n} - n^2 ; n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

Exercice 8. Montrer que $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel.

On raisonnera par l'absurde en posant $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, où p et q sont des entiers, et en comparant les puissances de 2 dans les diviseurs de p^2 et de $2q^2$.

Exercice 9.* Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

- (a) $|x + y| \leq |x| + |y|$
- (b) $||x| - |y|| \leq |x - y|$
- (c) $|x + y| = |x| + |y|$ si et seulement si x et y sont de même signe.

Exercice 10. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations

- (a) $|x - 1| + |x - 3| \leq 5$
- (b)* $\sqrt{x^2 + 3} - \sqrt{x^2 + 1} \leq 1$

Exercice 11. Montrer que :

- (a) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \implies E(x) \leq E(y))$
- (b)* $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (E(x) + E(y) \leq E(x + y) \leq E(x) + E(y) + 1)$
- (c)* $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq E(nx) - n E(x) \leq n - 1.$

Exercice 12. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $E(\sqrt{x^2 + 1}) = 2$.

Exercice 13.* Représenter dans un repère orthonormé la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x - E(x) \end{aligned}$$

En déduire les bornes inférieure et supérieure de la partie $A \subset \mathbb{R}$ définie par

$$A = \{ f(x) ; x \in \mathbb{R} \} .$$

• ◦ • fin • ◦ •